

高龄者肺炎球菌疫苗接种说明

1 肺炎球菌疫苗接种的效果

肺炎球菌疫苗是预防高龄者中最常见的「肺炎球菌」细菌感染的疫苗。虽然肺炎球菌疫苗并非能预防所有肺炎，但接种后可以期待对重症化的预防效果。

2 接种前的注意事项

(1) 一般注意

- ①请仔细阅读本通知，充分理解接种的必要性及副反应。
- ②如有不明之处或疑虑，请在接种前向担当医生咨询。
- ③肺炎球菌疫苗接种仅在本人希望接种时进行，因此请在充分理解后再进行接种。
- ④如果因认知症等原因无法确认接种者的接种意愿，则无法进行接种，请给予理解。
- ⑤新冠病毒疫苗接种与本疫苗接种之间需间隔前后两周。

(2) 不能接种的人士

- ①接种当天明显发热（37.5度以上）者
- ②患有严重急性疾病者
- ③曾因疫苗成分引发过过敏性休克（※）的人士
(※通常，在接种后约30分钟内发生的严重过敏反应。)
- ④过去曾接种过肺炎球菌疫苗者（曾在过去五年内接种过肺炎球菌疫苗的人士，接种后可能会出现注射部位硬化、疼痛、发红等明显反应。）
- ⑤其他被医生判断为不适合接种的情况

(3) 接种后的注意事项

- ①接种后30分钟内可能会出现突发副反应，请保持可以联系医生的状态。
- ②可正常洗澡，但请避免摩擦注射部位。
- ③接种当天请避免剧烈运动和大量饮酒。

④接种后请自行注意健康管理，如发现高热、身体状况变化或局部异常反应，请立即就医。

3 肺炎球菌疫苗接种的副反应

主要副反应包括注射部位的红肿、疼痛等。全身反应可能包括发热、寒战、头痛、乏力、呕吐、恶心、腹泻、关节痛、肌肉痛等，通常症状较轻，一般在2至3天内消失。可能会出现过敏反应，如皮疹、荨麻疹、湿疹、红斑、多形红斑、瘙痒等。

如接种后出现上述症状，请及时就医。如有其他疑问，请联系相关部门。

4 疫苗接种健康损害救济制度

如因市实施的疫苗接种副反应导致需要治疗或生活受到影响的健康损害，可以申请根据疫苗接种法获得健康损害救济制度的支援。

【问询处】

伊贺市役所 健康推进课

电话 0595-22-9653