

Para los adultos mayores que recibirán la vacuna antineumocócica

1. Efecto de la vacunación antineumocócica

Esta vacuna previene las infecciones bacterianas llamadas neumococo, que son la causa más común de neumonía en las personas mayores. Si bien la vacuna antineumocócica no previene todos los casos de neumonía, se espera que sea eficaz para prevenir la gravedad de la enfermedad.

2. Antes de vacunarse

(1) Precauciones generales

- ① Lea esta información detenidamente para comprender completamente la necesidad de la vacunación y sus efectos secundarios.
- ② Si tiene alguna pregunta o inquietud, consulte a su médico antes de vacunarse.
- ③ La vacuna antineumocócica solo se administrará si la persona desea vacunarse, por lo que debe vacunarse solo después de estar completamente convencido.
- ④ Tenga en cuenta que si presenta síntomas cognitivos u otros problemas y no podemos confirmar su deseo de vacunarse, no podrá vacunarse.
- ⑤ Por favor, espere dos semanas de intervalo con la vacunación contra el COVID-19.

(2) Restricciones para recibir la vacuna

- ① Si presenta fiebre (superior a 37,5 grados) el día de la vacunación.
- ② Si padece una enfermedad aguda grave.
- ③ Si ha sufrido un shock anafiláctico* debido a los componentes de la solución de vacunación. (*Se trata de una reacción alérgica grave que suele presentarse en unos 30 minutos después de la vacunación).
- ④ Si ha recibido previamente la vacuna antineumocócica. (Quienes han recibido la vacuna antineumocócica en los últimos cinco años pueden experimentar síntomas graves como endurecimiento, dolor y enrojecimiento en el lugar de la inyección).
- ⑤ Si su médico ha determinado que la vacunación no es adecuada.

(3) Precauciones generales después de recibir la vacuna

- ① Pueden presentarse efectos secundarios repentinos dentro de los 30 minutos posteriores a la vacunación, por lo que debe consultar a su médico.
- ② Se permite bañarse, pero evite frotar el lugar de la inyección.
- ③ Evite el ejercicio intenso y el consumo excesivo de alcohol el día de la vacunación.
- ④ Después de la vacunación, preste atención a su salud y, si nota fiebre alta, cambios en su condición física o cualquier otra reacción local anormal, consulte a un médico de inmediato.

3. Efectos secundarios de la vacunación antineumocócica

Los principales efectos secundarios incluyen enrojecimiento, hinchazón y dolor en el lugar de la inyección. Las reacciones sistémicas incluyen fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga, vómitos/náuseas, diarrea, dolor articular y dolor muscular, pero los síntomas suelen ser leves y desaparecen en 2 o 3 días. Las reacciones de hipersensibilidad incluyen, en raras ocasiones, erupción cutánea, urticaria, eccema, eritema, eritema multiforme y picazón.

Si experimenta alguno de los síntomas mencionados después de la vacunación, consulte a un médico. Si tiene alguna otra pregunta, póngase en contacto con el departamento correspondiente.

4. Sistema de compensación por daños a la salud causados por la vacuna

Si experimenta reacciones adversas a las vacunas administradas por la ciudad, como por ejemplo requerir tratamiento médico o quedar con discapacidades que interfieren con su vida diaria, puede ser elegible para recibir la compensación por daños a la salud según la Ley de Vacunación.

【Mayor Información】

Iga shiyakusho kenkō suishin ka

TEL: 0595-22-9653